




Maxforce[®]
QUANTUM

INSEKTSMEDEL

- ✓ Sirapsbaserat lockmedel
- ✓ Myrbekämpning i och omkring byggnader
- ✓ Enkel och effektiv



Mot myror



4 x 30 g e

Verksam beståndsdel:
Imidaklopid 0,03 vikt-%.
Förpackning: 30 gram per tub

Bekämpningsmedel. Reg. nr. 5383 Behörighetsklass 2
Användningsområde:
 Mot myror och tropiska myror. För användning inomhus och omkring byggnader.
 All annan användning är otillåten.
Använd biocider med största försiktighet. Läs etiketten.

Varning
 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

SE81722129C - ARTICLE 81726493

Batchnummer/Tillverkningsdatum: Se förpackningen.
Produkten är hållbar i minst 3 år från produktionsdatum.



Bayer AB
c/o Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 København S
Danmark
Telefon: +45 45 23 50 00
www.environmentalscience.bayer.se





Bruksanvisning
 Maxforce® Quantum kontrollerar och bekämpar myrbon av svartmyror och faraomyror. Bäst verkan uppnås genom att behandla så tidigt som möjligt, d v s så fort man ser myrorna.
 Den här produkten innehåller imidaklopid som är giftigt för bin.
 Maxforce® Quantum är ett sirapsbaserat lockmedel färdigt att använda med aktiva substansen imidaklopid för bekämpning av myror och deras bon.
 Maxforce® Quantum används där en diskret myrbekämpning önskas. Produkten appliceras med “appliceringspistol”, är luktfri och färgar inte. Det är en klar, droppfri sirap som kan appliceras både vertikalt och horisontellt, allt efter hur myrorna kommer in och är ett problem.
 Vid användning inomhus appliceras produkten längs myrstigar.
 Vid användning utomhus appliceras produkten endast i sprickor och springor och längs myrstigar på terrasser,gångar, verandor, ingångar till skjul, garage etc.
 Om boet är placerat i stenbelagd jord (t.ex. trädgårdsplattor, betong) kan produkten också placeras direkt i myrboets ingång(ar).
 Skydda från bin och väder genom att täcka över med t.ex. en blomkruka eller en tegelsten. Kontrollera att myrorna ändå kan komma åt betet. Applicera inte på hårda ytor eller barmark som används som myrstigar.
 EJ för användning på jord, gräsmattor eller rabatter.
 Vid användning runt byggnader applicera inte nära avlopp. Om den behandlade området har anslutning

till regnvattenuppsamling eller avloppssystem ska betet endast användas på platser som inte blir våta eller hamnar under vatten, dvs skydda produkten från regn, översvämningar eller rengöringsvatten.
 Maxforce® Quantum kan användas inom livsmedelsindustrin såsom kök, slakterier och lagerlokaler samt i offentliga och privata byggnader såsom sjukhus, hotell och lägenhetskomplex.
Dosering:
 Kläm ut 1 klick av betet på cirka 1 cm i diameter (200 mg) per kvadratmeter eller 1 klick per m myrstig.
 Om ett kök på 10 m² ska behandlas så lägger man ut 10 x 200 mg sirapsklickar.
 Applicera max 2 g produkt per myrbo. Ingen spädning.
 Vid direkt behandling av myrboet injiceras 2 g (10 klickar) direkt i boets ingång(ar).
 Placera alltid sirapsdropparna så nära myrorna som möjligt. Detta hjälper myrorna att hitta lockmedlet.
 Kontrollera betet en gång i veckan.
 Om angreppet fortsätter efter en applicering kan ytterligare applicering bli nödvändig. Efter en applicering är de flesta bon utrotade efter 14 dagar men det kan ta upp till 2 månader.
 Undvik kontinuerlig användning av produkten.
Bekämpning av faraomyror
 För att få ett bra resultat bör behandlingsområdet först undersökas för att bestämma hur behandlingen ska utföras. Detta görs genom att lägga ut giftfritt lockfoder i form av svinlever eller proteinbaserat lockfoder tills en klar bild framgår över var faraomyrorna håller till. Faraomyrorna är kända för att hålla

till vid ställen med hög temperatur, ca 27-30°C, och det är oftast flera bon som lever i samexistens.
 Efter att ha lokaliserat faraomyrornas utbredningsområde utförs behandling där faraomyrorna har lokaliserats samt tätt inpå de myrbon som lokaliserats. Faraomyrornas bon är ofta mycket svåra att hitta, t ex bakom köksbord, i hålrum i väggar, under golvpaneler, i elektriska installationer och apparater. För att erhålla en bra bekämpning av faraomyror (och myror generellt) är det viktigt att Maxforce® Quantum läggs ut tätt intill myrboet så att myrorna bär ner lockmedlet med gift i boet, vilket leder till att boet blir bekämpat inifrån med utrotning av drottningen.
Bekämpning av svartmyror
 För svartmyran utförs behandlingen i de skarvar och sprickor där myrorna ses komma från samt på de stigar där myrorna går. Lägg 200 mg sirapsklickar per löpmeter samt behandla i revor och sprickor där myrorna ses komma från.
OBSERVERA!
 • Använd lämpliga skyddshandskar.
 • Tvätta händer och exponerade hudområden innan du äter och efter användning.
 • När behandlingen är klar avlägsnas den tomma patronen och kasseras på ett säkert sätt.
 • Om patronen inte är helt tom avlägsnas den från applikatorn, förseglas med korken som medföljer och förvaras enligt anvisningarna.
 • Håll alltid rent från matrester och liknande i de områden där behandling utföres. Lockmedlets attraktion minskar i annat fall.

- Behandlingen utförs så att lockmedlet är oåtkomligt för barn och husdjur.
- Maxforce® Quantum är hållbart och bekämpar myrorna i upp till 12 veckor efter utläggningen.
- Förvaras i originalförpackningen på en torr, sval och väl ventilerad plats. Skyddas mot frost.
- Produkten och dess behållare måste kasseras på ett säkert sätt. Kassera innehållet/behållaren hos godkänd avfallsmottagare.
- Kontaminera inte bäckar, floder eller vattendrag med produkten eller använda behållare.

