



low-res Pdf - only for viewing!

Colors : **CYAN** **MAGENTA** **YELLOW** **BLACK**

**Övrigt**

Gelen misfärgar normalt inte underlaget. På porösa ytor kan gelen ge en tillfällig "fuktfläck" som avdunstar. Undvik ändå att applicera på känsliga ytor och textilier. Applicerad pasta tål temperaturer upp till +50°C. Förvaras i temperatur under 30°C och inte i direkt solljus. Tomemballage hanteras som hushållsavfall.

**Norsk bruksanvisning**

Mot kakkerlakker innendørs.  
**Innehold:** Tube 30 g.

**Advarsel.**

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Innhold/holder leveres til mottak for farlig avfall. Oppbevares utilgjengelig for barn.

**BRUKSANVISNING**

**Anvendelse**

Pastaen er klar til bruk og inneholder stoffer som tiltrekker ulike arter kakerlakker. Til Maxforce® White IC 30 g tuben finnes det et spesielt applikasjonsverktøy. Tuben plasseres i en "trykkpistol" som fører pastaen frem når man trykker på håndtaket. Først sørger man for god hygiene på arbeidsstedet. Benytt klisterfeller eller "spot flushing" for å identifisere områder med aktivitet. Pastaen drypper ikke og hefter på de fleste overflater. Plasser pastaen på mørke og skjulte steder hvor kakerlakker typisk oppholder seg, så som under kanter og lister, i hulrom og sprekker. Unngå å anbringe lokkematen på åpne eller utsatte steder, heller ikke på steder som vaskes regelmessig. Anbringes ikke på steder som nylig har blitt behandlet med et insekticid. Unngå å forurense lokkematen med andre insekticider. Dette kan føre til at lokkematen blir repellerende og at resultatet av bekjempelsen vil forringes.



Utlagt lokkemiddel skal kontrolleres regelmessig. Behandlingen gjentas etter behov. Etter inntak av dødelig dose vil det ta noen timer før kakerlakkene dør. Pastaen er spesielt velegnet i lokaler hvor man vil unngå å sprøyte med insekticider. Bekjempelsen skal utføres på en slik måte at mennesker, dyr, planter og næringsmidler ikke kommer i kontakt med produktet. Etter at bekjempelsen er gjennomført vaskes resterende pasta forsiktig bort med 5% natriumklorid.

**Dosering.**

Maxforce® White IC applikeres med tube med en dråpestørrelse på 5 mm i diameter, tilsvarende ca. 0,1 g produkt. Den applikerte mengde tilpasses etter forskjellige kakerlakkarter og angrepets omfang. Doseringen bør ikke overstige 0,3 g produkt pr. m<sup>2</sup>, eller pr. løpende meter (reol, panel, eller lignende). Behandlingen foretas med 1-3 punkter pr. m<sup>2</sup> inventaroverflate, eller 1-3 punkter pr. løpende meter i de infiserte områder. I tilfeller hvor kakerlakkene har mange skjulesteder innenfor et lite område, vil flere og mindre applikasjonspunkter gi et bedre og hurtigere effekt enn færre og større applikasjonspunkter. De større kakerlakkartene (*Periplaneta Americana*, *Blatta Orientalis* samt *Periplaneta Australiasiae*) krever generelt en høy dose. Det samme gjelder ved sterke angrep av de mindre artene (*Blattella Germanica* og *Supella Longipalpa*). En tube med 30 g holder til behandling av 100-300 m<sup>2</sup> eller løpende meter.

**Bemerk**

Pastaen vil normalt ikke medføre misfarging. På porøse overflater kan pastaens vannabsorberende egenskaper resultere i en fuktig flekk som vil tørke bort av seg selv. Unngå likevel å plassere pastaen på overflater og tekstiler som kan være følsomme for misfarging.

Applikert pasta tåler høye temperaturer (opp til 50°C). Oppbevares i romtemperatur (ikke over 30°C). Oppbevares ikke i direkte sollys.

**Avhending av tom emballasje**

Tom emballasje og rester kan avhendes sammen med vanlig restavfall.



**Maxforce®**  
**WHITE IC**

**INSEKTMIDDEL • INSEKTMEDEL**

- ✓ **Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker.**
- ✓ **Mot Kackerlackor inomhus. All annan användning är otillåten. Endast för yrkesmässigt bruk.**
- ✓ **Mot kakkerlakker innendørs.**

Kackerlackor



4 x 30 g e

<p><b>Dansk Advarsel.</b> Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410). Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Brugsanvisning: Se indlægssedel. Præparattype: Pasta. Analyse: Imidacloprid 2,15% w/w. Insektmiddel nr. 18-491. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.</p>	<p><b>Svensk Varning.</b> Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Brugsanvisning: Se iläggssedel. Beredningsform: Pasta Verksamma ämnen: Imidacloprid 2,15 vikt-% Behörighetsklass 2, Reg nr. 4469</p>	<p><b>Norsk Advarsel.</b> Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. P.nr. 100012. Analyse: Imidacloprid 2,15 vekt%. Bruksanvisning: Se vedlegg.</p>
---	---	--



NOR81771723A - ARTICLE 81687471

**Produktionsdato og batchnummer:** påtrykt emballagen. Produktet er minimum holdbart 3 år fra produktionsdato.

<p><b>Importør:</b> <b>Bayer A/S - Danmark</b> Arne Jacobsens Allé 13; 6. DK- 2300 København S Tlf.: +45 45 23 50 00 www.bayer-es.dk</p>	<p><b>Importør:</b> <b>Bayer AB</b> Postbox 13 245 21 Staffanstorp Tel: 040-418180</p>	<p><b>Importør:</b> <b>Bayer A/S</b> Postboks 14 0212 OSLO Tel: +47 24 11 18 00</p>
--	--	---



© Registrert varemerke tilhørende Bayer AG, Leverkusen, Tyskland





low-res Pdf - only for viewing!

Colors : MAGENTA YELLOW BLACK

**Dansk Brugsanvisning**

**Advarsel.**  
**Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).**  
**Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).**

Vask huden efter arbejdet.  
 Vær opmærksom på at Arbejdstilsynet har regler for arbejdets udførelse og personlige værnemidler.  
 Læs nærmere i den eventuelle lovpligtige leverandørbrugsanvisning.  
 Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

- Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker.**
- Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højeredoseringer end de i brugsanvisningen nævnte.**
- Må ikke tømmes i kloak.**
- Opbevares utilgængeligt for børn (P102).**
- Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

**Anvendelse**  
 Pastaen er klar til brug og indeholder fødeemner, som tiltrækker forskellige arter kakerlakker. Der findes et specielt applikationsværktøj til Maxforce® White IC 30 g tube.  
 Tuben placeres i en „trykpistol“, som fører pastaen frem, når håndtaget trykkes sammen.



Først sikres god hygiejne på behandlingsstedet.  
 Anvend klisterfælder eller ”spot flushing” til at identificere områder med aktivitet. Pastaen drypper ikke og hæfter på de fleste overflader og placeres på mørke og skjulte steder, hvor kakerlakker opholder sig, såsom under kanter og lister, i hulheder og sprækker. Undgå at anbringe lokkemaden på åbne eller udsatte steder, og ikke på flader, der afvaskes regelmæssigt.

Anbringes ikke på steder, som for nylig er blevet behandlet med et insekticid og undgå efterfølgende at forurene lokkemaden med anden insekticidbehandling. Dette kan medføre, at lokkemaden bliver repellerende, og resultatet af bekæmpelsen forringes.

Udlagt lokkemiddel skal kontrolleres regelmæssigt.  
 Efter behov gentages behandlingen.  
 Efter indtagelse af dødelig dosis varer det nogle timer, før kakerlakkerne dør.  
 Pastaen er specielt velegnet i lokaler, hvor man vil undgå at sprøjte med insekticider.  
 Udfør bekæmpelsen på en sådan måde, at mennesker, dyr, planter og levnedsmidler ikke kommer i kontakt med præparatet.  
 Efter gennemført bekæmpelse vaskes tilbageværende pasta bort.  
 Pastaen vaskes nemt bort med 5% natriumklorid.

**Dosering:**  
 Maxforce® White IC Kakerlak Pasta udbringes med en dråbestørrelse på op til 5 mm i diameter svarende til ca. 0,1 g produkt. Den udbragte mængde tilpasses efter forskellige kakerlakarter og angrebets omfang.  
 Doseringen bør ikke overstige 0,3 g produkt pr. m<sup>2</sup> eller pr. løbende meter (reol, panel o.l.).

Behandlingen foretages med 1 - 3 punkter pr. m<sup>2</sup> inventaroverflade eller 1 - 3 punkter pr. løbende meter i de inficerede områder.  
 I tilfælde, hvor kakerlakkerne har mange skjulesteder inden for et lille område, vil flere og mindre applikationspunkter give hurtigere og bedre effekt end færre og større applikationspunkter.  
 De større kakerlakarter (*Periplaneta americana*, *Blatta orientalis* samt *Periplaneta australiasiae*) kræver generelt en høj dosis. Det samme gælder ved stærke angreb af de mindre arter (*Blattella germanica* og *Supella longipalpa*).  
 En tube med 30 g rækker til behandling af 100 - 300 m<sup>2</sup> eller løbende meter.

**Bemærk:**  
 Pastaen misfarver normalt ikke. På porøse overflader kan pastaens vandabsorberende egenskab resultere i en „fugtig plet“, som tørrer bort af sig selv. Undgå dog at placere pastaen på følsomme overflader og tekstiler.  
 Applikeret pasta tåler høje temperaturer (op til 50°C).  
 Opbevares i stuetemperatur (ikke over 30°C). Ikke i direkte sollys.

**Værnemidler**  
 Brug nitrilgummihandsker og beskyttelsesbriller.

**Bortskaffelse af tom emballage**  
 Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler. (P501)  
 Emballagen må ikke genbruges.  
 Tomme beholdere og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

**Svensk bruksanvisning**

Behörighetsklass 2, Reg nr. 4469  
**Användningsområde:** Mot kackerlackor inomhus. All annan användning är otillåten.  
 Endast för yrkesmässigt bruk.

**Varning.**  
 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  
 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering som farligt avfall. Förvaras oåtkomligt för barn.

Lagras torrt och svalt. 30 gram tub.

**BRUKSANVISNING**  
**Användning**  
 Gelen är klar att användas och innehåller födoämnen som attraherar olika arter kackerlackor.  
 Till Maxforce® White IC finns ett speciellt appliceringsverktyg. Tuben placeras i en ”tryckpistol” som för fram gelen när handtaget trycks ihop.

Rengör först lokalen för att avlägsna alternativa födokällor. Använd gärna klisterfällor för att hitta rätt platser för applicering. Gelen placeras på platser där kackerlackor passerar eller uppehåller sig så som under kanter, längs med lister, i håligheter och sprickor m.m. Gelen har god vidhäftningsförmåga och droppar ej varför den också kan placeras i tak.



Undvik att placera gel på exponerade platser eller platser som torkas av.

Undvik att använda Maxforce® White IC i lokaler som nyligen behandlats med annan insekticid liksom att spruta lokalen. Detta kan göra att gelen mister sin attraktivitet och effekten avtar.  
 Kontrollera utlagd gel och upprepa behandlingen vid behov.  
 Efter förtäring av Maxforce® White IC tar det några timmar innan de första kackerlackorna dör. Gel är speciellt lämplig att använda i lokaler där man vill undvika att spruta.  
 Utför behandlingen så att människor, djur och livsmedel inte kommer i kontakt med preparatet.  
 Efter slutförd behandling tvättas gelen bort. 5% natriumklorid är bästa tvättlösning.

**Dosering**  
 Maxforce® White IC appliceras med en droppstorlek upp till 5 mm i diameter. Detta motsvarar ca 0,1 g produkt. Applicerad mängd anpassas till angreppets omfattning och art av kackerlaka. Doseringen bör inte överstiga 0,3 g produkt per m<sup>2</sup> eller löpmeter.  
 Applicera 1-3 droppar per m<sup>2</sup> eller löpmeter. På platser där kackerlackor förekommer i stor mängd är det effektivast med flera små droppar än få stora.

De större arterna kackerlackor (*Periplaneta americana*, *Blatta orientalis* samt *Periplaneta australiasiae*) bör bekämpas med en högre dos (3 droppar) liksom vid starka angrepp av de mindre arterna (*Blattella germanica* och *Supella longipalpa*).

En tub räcker till behandling av ca 100-300 m<sup>2</sup> eller löpmeter.

