 **SVENSKA**

Målorganismer:
 Tysk kackerlacka (*Blattella germanica*),
 Orientalisk kackerlacka (*Blatta orientalis*),
 Amerikansk kackerlacka (*Periplaneta americana*),
 Långsprötad silverfisk (*Ctenolepisma longicaudatum*).

Endast för inomhusbruk.
 En insekticid i gelform som är bruksfärdig för bekämpning av kackerlackor och silverfisk både i nymfstadie och vuxna.

För användning i:
 • Bostäder/hushåll
 • Lokaler för livsmedelshandling och lagring
 • Offentliga byggnader
 • Byggnader för djurhållning, ex. Zoo, djuraffärer, kennlar, veterinärmottagningar, laboratorier etc. (endast byggnad, foderhantering och förvaringsutrymmen. Inte i stall, boxar, burar etc. där djuren befinner sig)

ANVÄNDNING
Metod: Applicering av bete. Produkten doseras med lämplig gelapplikator.

Appliceringsdos:
 Applicera Maxforce Platin i droppar eller tunna strängar på ytor i identifierade målområden. Kan placeras i hörn, sprickor, springor och hålrum. Appliceringsdosen anpassas efter angreppets omfattning.

En droppe = 0,1 g (ca 7 mm i diameter); 0,007 g (3 mm); 0,002 g (2 mm).
 En tunn sträng motsvarande en droppe kan alternativt appliceras.

En effekt av bekämpningen kan förväntas snabbt och döda insekter kan ses inom 24 timmar efter påbörjad behandling. Maximal effekt uppnås mellan 6 dagar och 2 månader efter påbörjad bekämpning beroende på storleken på angreppet så länge gelen finns kvar.

Vid stora angrepp inspektera appliceringspunkterna regelbundet (en gång i månaden) och applicera mer gel vid behov.

Applicera inte mer än en gång per månad.

Kackerlackarter	Appliceringsdos för given angreppsgrad / m ²	
	Låg	Hög
Små t.ex. Tysk kackerlacka	En droppe x 0,1 g	Två droppar x 0,1 g
Stor t.ex. Orientalisk kackerlacka Amerikansk kackerlacka	Två droppar x 0,1 g	Tre droppar x 0,1 g

Gelen ska lämnas:
 i minst 14 dagar för små kackerlackor
 i minst 4 veckor för orientalisk kackerlacka
 i minst 12 veckor för amerikansk kackerlacka
 för att uppnå optimal effekt. Om kackerlackor fortfarande är synliga efter en månad så kan färsk gel appliceras.

Mot Silverfisk:
 Dos: 0,1 - 0,2 g per m²
 Applicera flera små droppar i områden där långsprötade silverfiskarna bor och gömmer sig, ex. Under trösklar, lister, paneler etc.

20 små droppar (ca 3 mm i diameter) eller 65 små droppar (ca 2 mm i diameter) motsvarar 0,1g - 0,2g per m². Gelen ska lämnas i minst 8 veckor för att uppnå optimal effekt. Om silverfiskar fortfarande är synliga därefter så kan färsk gel appliceras.

Före behandling ska området undersökas med lämplig metod för att identifiera var angrepp förekommer tex genom att använda fällor och/eller aerosoler för att jaga ut skadedjuret, leta efter spillning, ömsad hud, äggskal m.m.

Begränsning av exponeringen:
 • Använd CE-märkta (eller motsvarande) nitrilgummihandskar (minsta tjocklek 0,40 mm).
 • Undvik kontakt med huden.
 • Tvätta händer och exponerad hud innan du äter och efter användning.

• Applicera inte direkt på ytor där livsmedel eller djurfoder förvaras, hanteras eller förtärs.
 • Applicera enbart på platser som är oåtkomliga för barn och djur.
 • Öppna inte eller försök att återfylla doseringsprutor.

För maximal effekt ska produkten appliceras vid skadedjurens tillhåll och på vägen till deras födokällor. Ytterligare så ska alla andra födokällor för kackerlackor (avfall, matrester osv.) avlägsnas från det angripna området för att uppmuntra intag av gelen.

Undvik applicering på väldigt dammiga, fuktiga och smutsiga ytor.

Speciell uppmärksamhet ska ges till springor, håligheter och andra ställen insekter kan gömma sig, men även bakom och under maskiner, hushållsmaskiner och rördragningar.

Produkten kan placeras i håligheter, ventilationskanaler, hiss schakt, elektiska och elektroniska apparater etc.

På platser där man identifierat spridning av kackerlackor är det lämpligt att utöka appliceringen av produkten även till omkringliggande områden för att förbättra bekämpningen och undvika ytterligare spridning.

Applicera inte produkten på ytor som våttorkas.

Applicera inte produkten i områden som nyligen behandlats med annan insekticid och undvik att kontaminera gelen med andra insekticider.

Produkten ska inte användas i stallar, djurinhägnader och burar. Rekommenderas inte i byggnader som där det finns insektsätande fåglar och reptiler.

Anmärkingar:
Information: En del känsliga material såsom textilier kan fläckas av produkten. Prova först på en liten undanskymd yta om osäkerhet finns.

Undvik kontinuerlig användning av produkten.

Potentiell resistensbildning mot klotianidin hos insekter som ska bekämpas ska tas hänsyn till vid användning av produkten. För att undvika resistens kan följande metoder användas:
 • Tillämpa integrerade bekämpningsmetoder såsom kombinationer av kemiska och fysiska kontrollmetoder och sköta om tillräcklig renhållning av lokalen, med hänsyn tagen till lokala förhållanden (klimatförhållanden, målorganismer, användningsvillkor osv.).
 • Följ alltid produktens användningsinstruktioner som står på etiketten med avseende på applicering och dosering.
 • Alternera produkter som innehåller aktiva substanser med ett annat verknings sätt alltså undvik att använda endast neonikotinoider.
 • Det rekommenderas att använda Maxforce Platin i ett integrerat bekämpningsprogram.

• Regelbundna kontroller av effektiviteten bör genomföras för att säkerställa att resistens inte uppstår och för att undvika risker för återangrepp.
 • I eventuella fall där användningsinstruktionerna åtföljts och det trots det uppvisas resistens ska liknande produkter undvikas som ersättare, särskilt neonikotinoider.
 • Om bevis på resistens finns så ska alla åtgärder sättas in för att utrota den behandlade populationen. Åtgärderna varierar i olika situationer och kan innehålla ett antal olika både kemiska och mekaniska metoder.

LÄS ANVISNINGARNA NOGA INNAN ANVÄNDNING.
 INFORMERA REGISTRERINGSINNEHAVAREN OM EFFEKTEN UTEBLIR.
 APPLICERA INTE PÅ ABSORBERANDE YTOR.
 EXPONERA INTE BETET FÖR SOLLJUS ELLER VÄRME (T.EX. ELEMENT).
 SKYDDA FRÅN VATTEN.

Första hjälpen
Hudkontakt: Tvätta kontaminerad hud med tvål och vatten, skölj därefter med vatten. Om irritation utvecklas och kvarstår, sök läkarhjälp.
Ögonkontakt: Skölj omedelbart med rikliga mängder ljummet vatten, även under ögonlocken, under minst 5 minuter. Glöm inte att ta ur eventuella kontaktlinser. Om symptom kvarstår, sök läkarhjälp.
Förtäring: Skölj munnen med vatten. Kontakta giftinformationscentralen. Sök omedelbart läkarhjälp om symtom uppträder och/eller om stora mängder har förtärs. Om personen är vid medvetande, ge små mängder vatten att dricka. Vid medvetslöshet, placera personen i framstupa sidoläge och sök omedelbart läkarhjälp.

ANVISNINGAR FÖR BORTSKAFFANDE
 Efter behandlingen ska den tomma patronen avlägsnas och kasseras på ett säkert sätt. Om patronen endast har använts delvis ska den tas bort från applikatorn, förseglas med det medföljande locket och därefter förvaras enligt anvisningarna. Avlägsnande av gammal produkt/gel ska göras av professionell skadedjursbekämpare. Färskt bete kan avlägsnas med en svamp eller våt trasa med en 5% natriumklorid lösning. Rengöringsmaterial (svamp, trasa osv.) ska placeras i blandavfallsskärl. Hårdnat bete kan avlägsnas med spatel och ska placeras i blandavfallsskärl. Häll inte ut oanvänd produkt på marken, i vattendrag, i rör (handfat, toaletter osv.) eller i avloppet. Innehållet lämnas till samlingsställe för farligt avfall och tomma behållaren behandlas som blandavfall.



Maxforce[®]

PLATIN

HYÖNTEISMYRKKY • INSEKTSMEDEL

 **Käyttövalmis hyönteisgeeli torakkanymfien ja täyskasvuisten torakoiden sekä paperitoukan torjuntaan sisätiloissa.**
Bruksfärdig insekticid i gelform för användning mot kackerlackor och långsprötad silverfisk.

 **Mot kackerlackor och silverfiskar inomhus. All annan användning är otillåten.**

Käyttäjärhymä: koulutetut ammatillaiset
 Endast för yrkesmässig användare med utbildning
 Lupanumero/Tillståndsnr: FI-2021-0001
 Endast för yrkesmässigt bruk. Behörighetsklass 2, Reg nr. 5557




4 x 30 g e

Produktionsdato och batchnummer: /se förpackning.
 Säilyvyys huoneenlämmössä enintään 24 kuukautta.
 Hällbar til 2 år från produktionsdato

Bayer

Bayer A/S
 Bayer AB c/o Bayer A/S
 Arne Jacobsens Allé 13
 2300 København - Tanska/ Danmark
 Puh/Tel +45 45 23 50 00



 **SOUMI**

Kohde-eliöt:
 Russakka (*Blattella germanica*),
 Ruotsintorakka (*Blatta orientalis*),
 Amerikantorakka (*Periplaneta americana*),
 Paperitoukka (*Ctenolepisma longicaudatum*).

Sisäkäyttö. Käyttövalmis hyönteismyrkkygeeli torakkanymfien, täysikasvuisten torakoiden ja paperitoukkien torjuntaan.

Käyttökohteet:

- Asunnot
- Elintarvikkeiden käsittely- ja varastointitilat
- Julkiset rakennukset
- Tilat, joissa pidetään eläimiä kuten eläinpuistot, eläinkaupat, koiratarhat, eläinlääkärivastaanotot, laboratoriot jne. (vain rakennusrehunkäsittely- ja varastointitilat. Ei tilojen käsittelyyn, joissa pidetään eläimiä, esim. tallit, karsinat ja häkit.

KÄYTTÖOHJEET

Menetelmä: Valmisteen käyttäminen. Valmistetta levitetään käyttäen sopivaa geelilevitintä.

Annostus:
 Käytä Maxforce Platin -valmistetta pisaroina tai ohuina nauhoina kohdealueiden pintoihin. Voidaan käyttää nurkkiin, rakoihin, koloihin ja aukkoihin. Käytettävä määrä riippuu tuholaisongelman laajuudesta.

Pisara = 0,1 g (halkaisija noin 7 mm); 0,007 g (3 mm); 0,002 g (2 mm).
 Vaihtoehtoisesti valmistetta voidaan käyttää ohuena nauhana, jonka koko vastaa yhtä pisaraa.

Torjunta-aineen teho näkyy nopeasti, ja kuolleita hyönteisiä näkyy 24 tunnin sisällä käsittelyn alkamisen jälkeen. Täysi teho saadaan kuuden päivän – kahden kuukauden sisällä torjunnan aloittamisen jälkeen, tartunnan laajuudesta riippuen niin kauan kuin geeliä on jäljellä.

Suurissa hyönteisesiintymissä, tutki annostelupisteet säännöllisesti (kerran kuussa) ja lisää geeliä tarvittaessa. Älä annostelee valmistetta useammin kuin kerran kuussa.

Torakoiden torjunta:

Torakkalaji	Käytettävä määrä torakoiden esiintyvyyden mukaan /m ²	
	Pieni	Suuri
Pienikokoinen, esim. Russakka (Saksantorakka),	Yksi pisara x 0,1 g	Kaksi pisaraa x 0,1 g
Suurikokoinen, esim. Ruotsintorakka, Amerikantorakka	Kaksi pisaraa x 0,1 g	Kolme pisaraa x 0,1 g

Geelin annetaan vaikuttaa:
 vähintään 14 päivää pieniin torakoihin
 vähintään 4 viikkoa ruotsintorakkaan
 vähintään 12 viikkoa amerikantorakkaan
 optimaalisen tehon saavuttamiseksi. Mikäli torakoita näkyy vielä kuukauden kuluttua, uutta geeliä voidaan lisätä.

Paperitoukan torjuntaan:
Käyttömäärä: 0,1 - 0,2 g per m²
 Annostelee useita pieniä pisaroita paperitoukkien elin- ja piilopaikkoihin, esim. kynnysten, listojen ja seinäpaneelien alle.

20 pientä pisaraa (halkaisija noin 3 mm) tai 65 pientä pisaraa (halkaisija noin 2 mm)
 vastaten noin 0,1 – 0,2 g/m².
 Geelin on annettava vaikuttaa vähintään 8 viikon ajan optimaalisen tehon saavuttamiseksi. Mikäli paperitoukkia näkyy vielä 8 viikon jälkeen, uutta geeliä voidaan lisätä.

Ennen käsittelyä alue on tutkittava sopivalla menetelmällä levinneisyyden määrittämiseksi, esim. pyydyksillä ja/tai tuholaiset piiloistaan ajavalla aerosolilla, etsimällä jätöksiä, nahanluontijätteitä, munankuoria ym.

Altistumisen ehkäiseminen:

- Käytä CE-merkittyjä (tai vastaavia) nitriliikumikäsineitä (minimipaksuus 0,40 mm).
- Käytä sopivia suojakäsineitä käsiteltäessä tuotetta.
- Pese kädet ja altistunut iho ennen syömistä ja juomista.
- Älä käytä pinoilla joilla säilytetään, käsitellään tai syödään elintarvikkeita tai eläinrehuja.
- Käytä vain kohteissa, jotka ovat lasten ja eläinten ulottumattomissa.
- Älä avaa tai täytä uudelleen annosteluruiskua.

Parhaan tehon saamiseksi tuote on annosteltava tuholaisen olinpaikkoihin ja reitille ruoanlähteille. Kaikki muut torakoiden ravintolähteet (jätteet, ruoantähteet) on lisäksi poistettava saastuneelta alueelta geelin syönnin lisäämiseksi.

Vältä erittäin pölyisiä, likaisia tai rasvaisia pintoja.

Kiinnitä erityistä huomiota rakoihin, koloihin ja muihin paikkoihin, joissa hyönteiset voivat piiloutua, ja lisäksi paikkoihin koneiden takana ja alla, talouskoneisiin ja putkien läpivienteihin.

Tuotetta voidaan sijoittaa reikiin, ilmastointikanaviin, hissikuiluun, sähkö- ja elektroniisiin laitteisiin jne.

Eryteisesti paikoissa, joissa on havaittu uusien torakoiden saapumista ulkopuolisilta alueilta, voidaan annostella lisää valmistetta tehon parantamiseksi ja tuholaisen leviämisen estämiseksi.

Älä annostelee valmistetta pinnoille, joita pyyhitään kostealla.

Älä annostelee valmistetta pinnoille, joita on äskettäin käsitelty toisella hyönteismyrkkyllä, ja vältä saastuttamasta geeliä toisilla hyönteismyrkkyillä.

Valmistetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi eläintiloissa, karsinoissa tai häkeissä. Ei suosittella rakennuksiin, joissa on hyönteisiä syöviä lintuja tai matelijoita.

Huomautukset:
Muut tiedot: Jotkut arat materiaalit kuten tekstiilit voivat tahrantua valmisteesta. Mikäli epäilyttä, kokeile ensin pienellä, näkymättömällä alalla.

Vältä Valmisteen jatkuvaa käyttöä.

Potentiaalinen resistenssin kehittyminen klotianidiinille on otettava huomioon valmistetta käytettäessä. Resistenttien kantojen kehittymisen välttämiseksi voidaan käyttää seuraavia menetelmiä:

- Sovella integroitua torjuntaa, kuten kemiallisten ja fysikaalisten menetelmien yhdistelmiä, ja huolehdi tilojen riittävästä puhtaanapidosta ottaen huomioon paikalliset olosuhteet (ilmasto, torjuttavat eliöt, käyttöehdot j.n.e.
- Noudata aina valmisteen myyntipäilyksessä olevia käyttöohjeita koskien annostelua ja annostelutiheyttä.
- Käytä vaihdellen valmisteita, joilla on erilainen vaikutustapa eli vältä pelkästään neonikotinoidivalmisteiden käyttöä
- Maxforce Platin-valmistetta suositellaan käytettäväksi integroidussa torjuntaohjelmassa.
- Valmisteen tehokkuutta on seurattava säännöllisillä tarkastuksilla ja mahdollinen tehokkuuden heikentyminen tulee tutkia resistenttien kantojen syntymisen ja tuholaisongelman uusiutumisen estämiseksi.
- Mikäli käyttöohjeita on noudatettu ja silti on syntynyt vastustuskyky valmisteelle, on samankaltaisten valmisteiden, erityisesti neonikotinoidien, käyttöä korvaajana vältettävä.
- Mikäli resistenssiä ilmenee, on populaation hävittämiseksi käytettävä kaikkia mahdollisia keinoja. Torjuntatoimenpiteet vaihtelevat eri tilanteissa ja näihin voi kuulua useita erilaisia kemiallisia ja ei-kemiallisia menetelmiä.

LUE OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ.
 ILMOITA LUVANHALTIJALLE, MIKÄLI VALMISTEELLA EI SAAVUTETA HALUTTUA TORJUNTATEHOA.
 ÄLÄ KÄYTÄ HUOKOISILLA PINNOILLA.
 ÄLÄ ALTISTA SYÖTTÄÄ AURINGONPAISTEELLE TAI LÄMMÖLLE (ESIM. LÄMPÖPATTERILLE).
 SUOJAA SATEELTA

Ensiapu
Ihokosketus: Pese saastunut iho saippualla ja vedellä, huuhtelee sen jälkeen vedellä. Hakeudu lääkäriin, mikäli ihoärsytystä tai herkistymistä ilmenee tai jos oireet pitkiä tai voimistuvat.
Silmäkosketus: Huuhtelee välittömästi runsaalla määrällä haaleaa vettä. Poista mahdolliset piilolinssit. Jatka huuhtomista vähintään 5 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin, mikäli ärsytys jatkuu.
Nieleminen: Soita myrkytystietokeskukseen. Huuhtelee suu vedellä. Siirrä uhri raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa jossa on helppo hengittää. Jos henkilö on tajuissaan, anna pieni määrä vettä juotavaksi.

HÄVITTÄMISOHJEET
 Kun käsittely on valmis, poista tyhjä putkilo ja hävitä se turvallisesti. Jos putkilo käytetään vain osittain, poista se levittimestä, sulje se mukana toimitetulla tulpalla ja säilytä ohjeiden mukaan.

Vanhan geelin poistaminen on teetettävä ammattimaisella tuholaisorjulla.
 Syötti voidaan poistaa tuoreeltaan 5 % natriumkloridiliuoksella kostutetulla sienellä tai rätillä.. Puhdistukseen käytetyt välineet (sieni, riepu jne.) hävitetään sekajätteen mukana. Kuivunut syötti voidaan poistaa lastalla ja se hävitetään sekajätteen mukana.
 Älä kaada käyttämätöntä valmistetta maahan, vesistöihin, putkiin (pesuallas, wc-istuin) tai viemäriin.
 Sisältö hävitetään vaarallisena jätteenä. Tyhjä ja huuhdeltu pakkaus hävitetään sekajätteenä.

